

★検査当日は、この用紙を必ずご持参ください★

CT検査を受けられる方へ

患者番号： _____

様

あなたの検査日時は、 _____ から の予定です。
検査当日は、紹介状、保険証、当院診察券（お持ちの場合）、造影の場合は、問診票、承諾書
を持参して開始予定の30分前までにお越しいただき患者支援センター（医療連携室）で
受付をお願いします。
※緊急検査等により検査時間が前後する場合がありますので、ご了承ください。

CT検査とは、CT装置の中心にある大きな穴に体を入れて、
エックス線をあて、体の中の様子をコンピュータで処理し
画像化する検査です。主に体の輪切りの写真が撮影できます。



1. 検査前のご注意

- 食事や内服薬の制限はありません。
※検査のための水分（水やお茶）の制限はありません。
※食事は予約時間の3時間前までに軽食でお済ませください。
- 金属は検査の妨げになることがありますので、ヘアピン、アクセサリ、時計、眼鏡などは
予めはずしておいてください。湿布等もはずしておいてください。
また、ボタンや金属のついた服は着替えていただくことがあります。
- ペースメーカーや除細動器装着の方は検査ができないことがあります。
- 妊娠している方または可能性のある方は事前に医師または看護師へ必ずお知らせください。

2. 検査中のお願い

- ベッドに仰向けに寝て、体の力をぬいてリラックスしてください。
- 検査時間は検査部位によって異なりますが、約5～10分程度です。
- 検査中は痛みをともないませんので、体を動かさないでください。
- 検査中は検査担当者とマイクを通していつでも会話できますので、ご安心ください。

予約時間に遅れると、検査をうけられないことがあります。

来院できない時には、できるだけ早く 当院放射線科と検査依頼元の医療機関に
ご連絡ください。

その他、ご不明な点がございましたら遠慮なくご相談ください。

新小山市市民病院 放射線科
TEL：0285-36-0261

★検査当日は、この用紙を必ずご持参ください★

造影剤使用のための問診票

記載日： 年 月 日

患者番号： _____

様

(性別：) (年齢：)

検査を行うための参考といたしますので、下記の質問についてお答えください。

(○で囲んでください。)

1. 以前に造影剤を用いた検査を受けたことがありますか？

無 ・ 有 [CT造影 ・ PRI造影 ・ MRI造影 ・ 血管造影 ・ その他]

有の場合副作用がありましたか？

無 ・ 有 [じん麻疹 ・ 吐き気 ・ 嘔吐 ・ 発赤 ・ その他]

副作用があったのはいつですか？

検査中 ・ 検査後

2. アレルギー体質と言われたことがありますか？

無 ・ 有 [じん麻疹 ・ ぜん息 ・ 花粉症 ・ アトピー ・
薬剤 () ・ 食べ物 ()]

3. 次の病気はありますか？ またはかかったことがありますか？

無 ・ 有 [心臓の病気 (心不全・狭心症等) ・ 肝臓の病気 (肝硬変等) ・
糖尿病 ・ 甲状腺機能亢進症 ・ 腎臓の病気 ・ 透析中
乳癌手術 (みぎ・ひだり) ・ その他 ()]

4. 今までに注射や薬で気分が悪くなったり、じん麻疹等が出たりしたことがありますか？

無 ・ 有 [薬品名 ()]

5. 現在薬を服用していますか？

無 ・ 有 [血圧の薬 () ・ アレルギー ()
糖尿病の薬 () ・ その他 ()]

6. 体内に金属がありますか？

無 ・ 有 [ペースメーカー ・ クリップ ・ 人工関節 ・ その他]

7. 女性の方へ：現在妊娠またはその可能性がありますか？

無 ・ 有

8. その他、お気づきの点やご不明な点がありましたら、ご記入ください。

[]

造影剤使用検査に関する説明・同意書

患者番号：

様

平成 年 月 日

私は、 様 に 検査で造影剤を使用するにあたって、以下の説明を行いました。

【造影検査とは】

造影検査とは、造影剤の注射をして行う検査です。この検査により病変の性状や部位などがわかりやすくなり、診断に大変役に立ちます。

注射された造影剤は、腎機能が正常であれば注射後約6時間で90%が尿となって排出され、やがて全てが体外へと排出されます。

【副作用について】

造影剤は安全な薬剤ですが、他の薬と同様に造影剤による副作用が生じる場合があります。また副作用には、検査中や直後に生じる即時性副作用と、検査終了後数時間から数日後に起きる遅発性副作用があります。

- 即時性副作用：ほとんどが、くしゃみや一時的に気分が悪くなったり、吐き気、じん麻疹が出たり、かゆみがおきたりといった軽いものです。まれに冷や汗が出たり、胸が苦しくなったりすることがあります。また約40万人に1人程度の割合で、ショックなどの重い副作用を生じることがあり、極めてまれですが死に至る報告もあります。
- 遅発性副作用：まれに、検査終了後数時間から10日後くらいの間に頭痛や、体がだるくなったり、じん麻疹が出たりすることがあります。

これらの副作用が生じた場合には、処置、治療が必要なことがありますので、申し出てください。また、他に何か異常が現れた場合には、すぐに来院されるか、病院にご連絡ください。

説明医師

印

新小山市民病院 病院長殿

年 月 日

私は、 に予定された造影剤使用検査の必要性と、検査で使用する造影剤の説明を受け、十分に理解しましたので造影剤の使用に同意いたします。また、緊急の事態が発生した場合には、それに対する処置を受ける事にも同意いたします。

本人署名：

印

保護者または
代理人署名：

印 (続柄：)

